

人结肠癌细胞HCT-15



Cat No. : SC0015

细胞名称	人结肠癌细胞HCT-15	英文名称	HCT-15		
形态特性	上皮细胞样	生长特性	贴壁生长		
种属	人				
组织	结肠				
培养体系	RPMI1640+10% FBS+1% P/S	气相: 空气, 95%; CO ₂ , 5%。 温度: 37°C			
倍增时间	~24h				
STR	Amelogenin: X, Y; CSF1PO: 12; D13S317: 8, 11; D16S539: 12, 13; D18S51: 11, 17; D19S433: 14, 16; D21S11: 29, 32.2; D2S1338: 17, 25; D3S1358: 17; D5S818: 13; D7S820: 10, 12; D8S1179: 15; FGA: 22; TH01: 7, 9.3; TPOX: 8, 11; vWA: 18, 19;				
简介	DNA fingerprinting证据表明, 这株细胞和DLD-1(ATCC CCL-221, 人结直肠腺癌)来源于同一个人; 但同工酶及细胞染色体组型分析仍存疑问; 细胞呈CSAp阴性(CSAp-); 角蛋白阳性				
基因表达	carcinoembryonic antigen (CEA) 5.4 ng/10 ⁶ cells/10 days. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining.				
致瘤性	Yes, in nude mice (Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10 ⁷ cells).				
传代方法	建议第一次1:2传代				
冻存条件	90 FBS+10% DMSO, 推荐无血清冻存液 (CX001)				
用途	仅限于科学研究, 不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。				
备注					

一、细胞收到后处理

请显微镜下确认细胞状态, 同时给刚收到的细胞拍照(10×, 20×)各2-3张以及培养瓶外观照片一张留存, 作为售后时收到时细胞状态的依据。

收到细胞回到自己的实验室后, 先打开外包装, 用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内, 严格无菌操作, 不开瓶盖放培养箱静置2-3小时稳定细胞状态。镜下观察: 未超过80%汇合度时, 可将瓶装的完全培养液收集至离心管中, 重新加入6ml完全培养基, 放入37°C、5%CO₂孵箱培养; 超过80%汇合度时, 根据情况传代或者冻存。悬浮细胞需离心收集处理。抽出瓶中的培养基和细胞1000rpm离心3-5分钟, 弃去上清重悬后接种到新的培养瓶中(加入按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基)。

(注意发货的是密封培养瓶的话, 处理完后放入培养箱培养记得培养瓶盖子拧松, 初次传代最好使用T25培养瓶或6cm小皿1传2)



二、细胞培养步骤

1. 复苏细胞：将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻，加入5mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加4-6mL完全培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入6cm皿中)，培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。

2. 细胞传代：如果细胞密度达80%-90%，即可进行传代培养。

对于贴壁细胞，传代可参考以下方法：

1: 弃去培养上清，用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。

2: 加1-2ml消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中，置于37℃培养箱中消化1-2min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆并脱落，迅速拿回操作台，轻敲几下培养瓶后加5ml以上含10%血清的完全培养基终止消化。

3: 轻轻吹打细胞，完全脱落后的吸出悬液至15ml离心管中，在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀。

4: 将细胞悬液按1: 2到1: 5的比例分到新的含5-6 ml培养液的新皿中或者瓶中。

对于悬浮细胞，传代可参考以下方法：

1: 收集细胞，1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀，将细胞悬液按1: 2到1: 5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。

2: 较脆弱的悬浮细胞可选择半数换液方式将培养瓶竖置1-2小时待大部分细胞沉到底部后，弃去半数培养基后，将剩余细胞悬起，将细胞悬液按1: 2到1: 3的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。

3: 细胞冻存：待细胞生长状态良好时，可进行细胞冻存。贴壁细胞冻存时，弃去培养基后加入少量胰酶，细胞变圆脱落，进行离心收集，1000RPM条件下离心3-5分钟，去除上清，按冻存数量加入血清及DMSO，冻存比例为90%FBS+10%DMSO。