

细胞名称	人乳腺导管癌细胞HCC1500		英文名称	HCC1500
形态特性	上皮细胞样		生长特性	贴壁生长
种属	人			
组织	乳房, 管, 乳腺; 癌症, 导管, TNM阶段IIB, 2级			
培养体系	RPMI1640+10% FBS+1% P/S 气相: 空气, 95%; CO ₂ , 5%。 温度: 37°C			
倍增时间	每周2-3次			
STR	Amelogenin: X D13S317: 10 D5S818: 11, 13 D7S820: 11 TH01: 9 TPOX: 8 vWA: 13, 16 D3S1358: 15 D21S11: 27, 30 D18S51: 13, 16 Penta_E: 7 D16S539: 9, 10 CSF1PO: 10 Penta_D: 2, 2, 5 D8S1179: 13, 14 FGA: 23 D19S433: 13 D2S1338: 18, 23			
简介	HCC1500 是从一名 32 岁黑人女性导管癌 TNM IIB 期 2 级患者的乳腺中分离出的上皮细胞。该肿瘤被分类为 TNM IIB 期、2 级、浸润性导管癌，24 个淋巴结中有 4 个发生转移。细胞分化较差。这些细胞的 Her2-neu 表达呈阴性，但 p53 表达呈阳性。HCC1500 上皮细胞特异性标记物上皮糖蛋白 2 (EGP2) 和细胞角蛋白 19 呈阳性。这些细胞的雌激素受体 (ER) 和孕激素受体 (PR) 表达呈阳性。HCC1500 在 3p21.3 处包含纯合缺失。			
传代方法	建议第一次1:2传代			
冻存条件	90 FBS+10% DMSO, 推荐无血清冻存液 (CX001)			
用途	仅限于科学研究，不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。			
备注				

一、细胞收到后处理

请显微镜下确认细胞状态，同时给刚收到的细胞拍照(10×, 20×)各2-3张以及培养瓶外观照片一张留存，作为售后时收到时细胞状态的依据。

收到细胞回到自己的实验室后，先打开外包装，用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内，严格无菌操作，不开瓶盖放培养箱静置2-3小时稳定细胞状态。镜下观察：未超过80%汇合度时，可将瓶装的完全培养液收集至离心管中，重新加入6ml完全培养基，放入37°C、5%CO₂孵箱培养；超过80%汇合度时，根据情况传代或者冻存。悬浮细胞需离心收集处理。抽出瓶中的培养基和细胞1000rpm离心3-5分钟，弃去上清重悬后接种到新的培养瓶中（加入按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基）。

(注意发货的是密封培养瓶的话，处理完后放入培养箱培养记得培养瓶盖子拧松，初次传代最好使用T25培养瓶或6cm小皿1传2)



二、细胞培养步骤

1. 复苏细胞：将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻，加入5mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加4-6mL完全培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入6cm皿中)，培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。

2. 细胞传代：如果细胞密度达80%-90%，即可进行传代培养。

对于贴壁细胞，传代可参考以下方法：

1: 弃去培养上清，用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。

2: 加1-2ml消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中，置于37℃培养箱中消化1-2min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆并脱落，迅速拿回操作台，轻敲几下培养瓶后加5ml以上含10%血清的完全培养基终止消化。

3: 轻轻吹打细胞，完全脱落后来吸出悬液至15ml离心管中，在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀。

4: 将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含5-6 ml培养液的新皿中或者瓶中。

对于悬浮细胞，传代可参考以下方法：

1: 收集细胞，1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀，将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。

2: 较脆弱的悬浮细胞可选择半数换液方式将培养瓶竖置1-2小时待大部分细胞沉到底部后，弃去半数培养基后，将剩余细胞悬起，将细胞悬液按1:2到1:3的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。

3: 细胞冻存：待细胞生长状态良好时，可进行细胞冻存。贴壁细胞冻存时，弃去培养基后加入少量胰酶，细胞变圆脱落时，进行离心收集，1000RPM条件下离心3-5分钟，去除上清，按冻存数量加入血清及DMSO，冻存比例为90%FBS+10%DMSO。